

I. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia się przez dziecko koronawirusem

1. Każdemu przyprowadzanemu do żłobka dziecku mierzona jest temperatura ciała. Pomiaru dokonuje się termometrem bezdotykowym w przedsionku budynku.
2. Każdy pracownik jednostki pełniący dyżur poranny jest upoważniony do wykonania powyższego pomiaru.
3. W przypadku stwierdzenia u dziecka podwyższonej temperatury ciała, dziecko nie może być wpuszczone do dalszej części budynku żłobka.
4. Rodzic dziecka zobowiązany jest oczekiwać przed wejściem do budynku na dokonanie powyższego pomiaru, a w przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury u dziecka, zobowiązany jest natychmiast odebrać dziecko i udać się z nim do domu.
5. Dziecko z prawidłową temperaturą ciała odprowadzane jest przez pracownika żłobka do szatni i grupy.
6. W przypadku kiedy w czasie pobytu w żłobku u dziecka wystąpią niepokojące objawy chorobowe należy odizolować je w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu (izolatce). Powinno tam przebywać do czasu odebrania tego dziecka przez jego rodzica. Dyrektor żłobka lub inny wyznaczony pracownik powiadamia natychmiast telefonicznie rodzica dziecka o umieszczeniu w izolatce, wzywając od jak najszybszego odebrania dziecka z placówki.
7. W izolatce dziecko przebywa pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora jednostki.
8. W przypadku wystąpienia u dziecka objawów zagrażających życiu, typu utrata przytomności, temperatura powyżej 39⁰C, silne wymioty, duszący kaszel, dyrektor lub inny pracownik jednostki wzywa natychmiast pogotowie ratunkowe i powiadamia o tym telefonicznie rodzica dziecka.
9. Pracownik przebywający z dzieckiem w izolatce zobowiązany jest przed wejściem do izolatki ubrać fartuch z długim rękawem, jednorazowe rękawiczki i maseczkę ochronną.
10. Po opuszczeniu przez dziecko izolatki pracownik, który przebywał z dzieckiem w tym pomieszczeniu, zobowiązany jest posprzątać i zdezynfekować niezwłocznie te pomieszczenie.
11. W przypadku wystąpienia w tym samym czasie podejrzenia zakażenia się przez więcej niż jedno dziecko, wszystkie dzieci z takim podejrzeniem umieszcza się w tej samej izolatce. Stosuje się wobec nich taką samą procedurę jak określona powyżej.